


立山, スイスアルプス, レーニア山

Tateyama, Swiss Alps and Mt. Rainier




立山とよく似た緯度の地域にスイスアルプス、レーニア山がある。いずれも高山植物が豊富な所として知られている。この2つの地域と立山の植物相を比較する。

The Swiss Alps and Rainier Mountains are located in areas similar in latitude to Tateyama, both of which are known to be rich in alpine plants. Compare the flora of these two areas with Tateyama.

立山、スイスアルプス、レーニア山の植物相の比較 Compare the flora of three area

地域 Area	国 Country	種数 Number of species	種数が多い科 1位 Most abundant family	種数 No.	種数が多い科 2位 Second-richest family	種数 No.	種数が多い科 3位 Third-richest family	種数 No.
立山 Tateyama	日本 Japan	710	ツツジ科 Ericaceae	35	キク科 Asteraceae	30	イネ科 Poaceae	23
スイス アルプス Swiss Alps	スイス Swiss	580	キク科 Asteraceae	82	キンボウゲ科 Ranunculaceae	34	アブラナ科 Brassicaceae	30
レーニア山 Mt. Rainier	アメリカ 合衆国 USA	841	キク科 Asteraceae	100	イネ科 Poaceae	82	カヤツリグサ科 Cyperaceae	47



出典
立山：富山県(1999)立山地区動植物種多様性調査報告書
スイスアルプス：Landolt and Urbanska (1989) Our Alpine Flora
レーニア山：Biek (2000) Flora of Mount Rainier National Park

立山、スイスアルプス、レーニア山の3山に分布する種(近縁種) Plants common to Tateyama, Swiss Alps and Mt. Rainier

立山、スイスアルプス、レーニア山の3地域に共通して分布する種は、氷期に南下してきた周北極要素と呼ばれる植物が多く含まれる。

Many of the common species in Tateyama, Swiss Alps and Mt. Rainier are called circumpolar elements which has been came down to southern area in glacial epoch.



タテヤマキンバイ
一の越の砂礫地に分布
Creeping Sibbaldia
Habitat: gravel land in
Ichinokoshi area.



チョウノスケソウ
一の越の砂礫地に分布
White Mountain Avens
Habitat: gravel land in
Ichinokoshi area.



ツマトリソウ
美女平から室堂の林床に分布
Starflowers
Habitat: under thicket in
Bijodaira, Midagahara and
Murodo.



ムシトリスミレ
弥陀ヶ原や室堂の湿地に分布
Butterwort
Habitat: moist place in
Midagahara and Murodo.

